

Gly-Coramin®

NOVARTIS CONSUMER HEALTH

Zusammensetzung

1 Lutschtablette enthält 125 mg Nikethamid, 600 mg Glucose in Form von Stärkesirup, 1,1 g Saccharose sowie Aromastoffe.

1 Lutschtablette enthält 0,27 Brotwerte.

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten

Ermüdungserscheinungen bei körperlichen Anstrengungen sowie bei Beschwerden, die durch einen Höhengenaufenthalt oder Luftdruckveränderungen wie z.B. beim Berggehen hervorgerufen werden.

Dosierung/Anwendung

Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren: 1 Lutschtablette im Munde zergehen lassen. In der Regel können auf den Tag verteilt bis zu ca. 10 Lutschtabletten eingenommen werden. Gly-Coramin soll bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht angewendet werden.

Kontraindikationen

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber in Gly-Coramin enthaltenen Substanzen. Epilepsie, Porphyrie, Bluthochdruck.

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen

Gly-Coramin enthält Glucose sowie Saccharose und ist deshalb für Diabetiker nicht geeignet.

Hinweis für Sportler: Die Einnahme von Gly-Coramin kann eine positive Reaktion bei Antidoping-Kontrollen zur Folge haben.

Schwangerschaft/Stillzeit

Bei bestehender oder geplanter Schwangerschaft und während der Stillzeit sollte Gly-Coramin nicht eingenommen werden. Schwangerschaftsbedingte Ermüdungserscheinungen sollen nicht mit Gly-Coramin behandelt werden.

Unerwünschte Wirkungen

Bisher sind keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Zulassungsvermerk

25385 (Swissmedic).

Zulassungsinhaber

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Bern.

Stand der Information

Oktober 2003.

Für dieses Präparat existiert keine behördlich genehmigte Fachinformation. Der Text ist eine von der Documed erstellte Kurzfassung (Pseudo-Fachinformation) der behördlich genehmigten Patienteninformation. Dieser Text wurde vom verantwortlichen Unternehmen zur Publikation durch die Documed AG freigegeben. © Copyright 2006 by Documed AG, Basel. Die unberechtigte Nutzung und Weitergabe ist untersagt. [27.02.2006]